

## **BRWI – PRZECIWWSKAZANIA**

1. Ciąża, karmienie piersią (pigmentacja możliwa minimum po 3 miesiącach od zakończenia karmienia piersią)
2. Infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze w miejscu zabiegowym. Podwyższona temperatura.
3. Nieustabilizowana cukrzyca (problem z krzepiwością krwi, zaburzenie percepcji odczuwania, skłonności do infekcji)
4. Nowotwór (Konieczna konsultacja lekarska)
5. Leki i używki rozrzedzające krew (aspiryna, acard, polocard, alkohol, napoje wysokokawowe, używki, duża ilość kofeiny)
6. Leki sterydowe (6-12 miesięcy po odstawieniu leków) Naskórek po sterydach jest cienki, a naczynia krwionośne mogą być rozszerzone.
7. Odżywki do brwi (1-2 mies.po odstawieniu) Odżywki są zazwyczaj na sterydzie, który może powodować rozszerzenie naczyń krwionośnych.
8. Łuszczyca. Prawdopodobieństwo szybszego wyłuszczenia pigmentu (skrócony proces keratynizacji). Możliwość wywołania dodatkowych ognisk zapalnych (efekt Koebnera)
9. Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej (plastyka powiek, lifting,), blizny. Możliwość pracy po 6-12 mies.
10. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (botox). Możliwość pracy po miesiącu.
11. Opryszczka. Aktywna opryszczka jest bezwzględny przeciwwskazaniem. Możliwość pracy po 2 tyg.od wygojenia.
12. Problemy z krzepiwością krwi (hemofilia). Zwiększone prawdopodobieństwo migracji pigmentu. Utrudniony proces gojenia.
13. Epilepsja.

14. Stany zapalne skóry poddawanej pigmentacji. Możliwość rozprzestrzenienia zmian skórnych.
15. Kuracja retinoidami. Możliwość pracy po okresie ok 6 miesięcy.
16. Intensywna opalenizna. Zaburzenie prawidłowej oceny tonacji naskórka, rozszerzone naczynia krwionośne.
17. Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
18. Przyjmowanie antybiotyków. Możliwość pigmentacji po ok. miesiącu od zakończenia przyjmowania leku.
19. Immunosupresja – hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych.
20. Choroby naczyń obwodowych, różnego rodzaju choroby serca i układu krążenia, małopłytkowość, niedokrwistość, choroby związane ze znacznym spadkiem krzepnięcia krwi
21. Choroby skóry:
  - \* Egzema \* Grzybica skóry \* Liszaj płaski \* Rumieniec \* Bliznowce \* Pokrzywka \* Atopowe zapalenia skóry \* Brodawki płaskie w miejscu pigmentacji \* Choroby zapalne skóry, w zamierzonym obszarze tatuowania - w okresie zaostrzenia. \* Trądzik - obecność ropnych ognisk zapalnych i trądziku różowatego - zapalne zaostrzenie choroby, w ostrym stadium stanowi przeciwwskazanie do procedury wykonania zabiegu.
22. Zapalenie tkanki łącznej.
23. Zabieg usuwania makijażu permanentnego (konieczność odstępu czasowego 6tyg.)