

## USTA – PRZECIWWSKAZANIA

1. Cięża, karmienie piersią (pigmentacja możliwa minimum po 3 miesiącach od zakończenia karmienia piersią)
2. Infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze w miejscu zabiegowym. Podwyższona temperatura.
3. Nieustabilizowana cukrzyca (problem z krzepiwością krwi, zaburzenie percepcji odczuwania, skłonności do infekcji)
4. Nowotwór (Konieczna konsultacja lekarska)
5. Leki i używki rozrzedzające krew (aspiryna, acard, polocard, alkohol, napoje wysokokowe, używki, duża ilość kofeiny)
6. Leki sterydowe (6-12 miesięcy po odstawieniu leków) Naskórek po sterydach jest cienki, a naczynia krwionośne mogą być rozszerzone.
7. Łuszczyca. Prawdopodobieństwo szybszego wyłuszczenia pigmentu (skrócony proces keratynizacji). Możliwość wywołania dodatkowych ognisk zapalnych (efekt Koebnera)
8. Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej.
9. Opryszczka. Tendencja do opryszczki przy pigmentacji ust jest wskazaniem do zażywania heviranu (800mg) 3 dni przed i po zabiegu. Aktywna opryszczka jest bezwzględnym przeciwwskazaniem. Możliwość pracy po 2 tyg. od wygojenia.
10. Problemy z krzepiwością krwi (hemofilia). Zwiększone prawdopodobieństwo migracji pigmentu. Utrudniony proces gojenia.
11. Epilepsja.
12. Stany zapalne skóry poddawanej pigmentacji. Możliwość rozprzestrzenienia zmian skórnych.
13. Kuracja retinoidami. Możliwość pracy po okresie ok 6 miesięcy.

14. Intensywna opalenizna. Zaburzenie prawidłowej oceny tonacji naskórka, rozszerzone naczynia krwionośne.
15. Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
16. Przyjmowanie antybiotyków. Możliwość pigmentacji po ok. miesiącu od zakończenia przyjmowania leku.
17. Immunosupresja – hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych.
18. Choroby naczyń obwodowych, różnego rodzaju choroby serca i układu krążenia, małopłytkowość, niedokrwistość, choroby związane ze znacznym spadkiem krzepnięcia krwi
19. Choroby skóry:
  - \* Egzema \* Grzybica skóry \* Liszaj płaski \* Rumieniec \* Bliznowce \* Pokrzywka \* Atopowe zapalenia skóry \* Brodawki płaskie w miejscu pigmentacji \* Choroby zapalne skóry, w zamierzonym obszarze tatuowania - w okresie zaostrzenia. \* Trądzik - obecność ropnych ognisk zapalnych i trądziku różowatego - zapalne zaostrzenie choroby, w ostrym stadium stanowi przeciwwskazanie do procedury wykonania zabiegu.
20. Zapalenie tkanki łącznej.
21. Zabieg usuwania makijażu permanentnego (konieczność odstępu czasowego 6tyg.)